

تواتر الأليلات والأنماط الفردانية لمستضدات الكريات البيضاء البشرية المسببة لخطر الإصابة بالداء الزلاقي عند الأشخاص السليمين في سوريا

د. عادل الجبال، أ.د. عماد الدين أبو خميس

Alhabbal A., AbouKhamis I.,

كلية الصيدلة، جامعة دمشق

Faculty of pharmacy, Damascus University

الملخص:

يحدث الداء الزلاقي فقط عند الأشخاص القادرين على التعبير عن مستضدات الكريات البيضاء البشرية HLA DQ2 & DQ8، ويشكل هؤلاء الأشخاص الذين يعبرون عن هذه المستضدات ما يقارب ثلث الأشخاص في الغرب، ونظراً لأن الداء الزلاقي غير شائع ومدروس بشكل جيد في سوريا فلقد قمنا بتقييم احتمال وجود هذه الجينات ذات الصلة في مجموعة من الأفراد السوريين، حيث قمنا بدراسة 100 شخص بدون أي أعراض معوية أو أمراض مناعية ذاتية ولاحقاً تم استخلاص الحمض النووي DNA من الدم الوريدي وتضخيمه بواسطة تفاعل البوليميراز التسلسلي باستخدام البادئات الخاصة بالأليلات التي تحدد الأنماط الفردانية لخطر الإصابة بالداء الزلاقي وهي :

DQA1*0201, DQA1*0301, DQA1*0501, DQA1*0502
DQB1*02, DQB0302

من بين 100 شخص من الأصحاء كان النمط الأكثر انتشاراً DQ2.5/DQ2.5 بنسبة 11%， تليه الأنماط الفردانية DQ2.5/DQ2.2 و DQ2.2/DQ8 و DQ8 و DQ2.5/DQ8 و من الأشخاص فقط، بينما كانت الأنماط الأقل انتشاراً DQ2.5/DQ8 و DQ2.2/DQ2.2 بنسبة 2% وفي المجمل كان 30 % من المشاركون في الدراسة

تواتر الأليلات والأنماط الفردانية لمستضادات الكريات البيضاء البشرية المسببة لخطر الإصابة بالداء الزلاقي عند الأشخاص السليمين في سوريا

يمكون نمطاً أو أكثر من الأنماط الفردانية المؤهبة لخطر الإصابة بالداء الزلاقي HLA .DQ2.5,DQ2.2,DQ8

كلمات مفتاحية: الأنماط الفردانية، الداء الزلاقي، الغلوتين، مستضادات الكريات البيضاء البشرية، سوريا

Frequency of HLA Celiac Disease Risk Alleles and Haplotypes in Healthy Individuals in Syria

Abstract:

Celiac disease (CeD) occurs only in individuals who are able to express human leukocyte antigens (HLA)DQ2 orDQ8, and these are expressed in nearly a third of healthy people in the West. As the disease is very uncommon in Syria, we evaluated the possibility that the relevant genes are infrequent in this population. one hundred healthy adults without any gastrointestinal symptoms or autoimmune disease. Genomic DNA was extracted from venous blood and amplified

by PCR using the specific primers for the following alleles which determine the CeD risk haplotypes:

DQA1*0201, DQA1*0301, DQA1*0501, DQA1*0502 and DQB1*02, DQB0302

Among 100 healthy subjects, the most common haplotype was DQ2.5 / DQ2.5 at 11%, followed by DQ2.5 / DQ2.2, DQ2.2 / DQ8 and DQ8 haplotypes by 5% of subjects only, while the less prevalent haplotype were DQ2.5 / DQ8 and DQ2.2 / DQ2.2 by 2%. Overall, 30 % of the study participants had one or more haplotypes that predispose to developing HLA DQ2.5, DQ2.2, DQ8.

Key words: Haplotype, celiac disease, Gluten, Human Leucocyte antigen, Syria

المقدمة:

الداء الزلقي هو اعتلال مزمن متواسط بالمناعة في الأمعاء الدقيقة يتسبب فيه التعرض للغلوتين الغذائي لدى الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي لذلك¹. يُعد الالتزام الصارم بحمية غذائية خالية من الغلوتين أمراً مهماً، نظراً لأن مرض الداء الزلقي غير المعالج قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، مثل زيادة احتطار الإصابة بالأورام الخبيثة أو كسور العظام أو العقق، خاصة أنه في بعض الحالات لا تتوافق النتائج المخبرية والنسيجية مع الأعراض التي يبديها المرضى وقد تكون غير كافية للتشخيص المباشر².

تختلف أعراض الإصابة بالداء الزلقي عند الرضع والأطفال عن أعراض الإصابة نفسها عند البالغين، وإن كانت الغالبية العظمى للإصابات تشخيص في مرحلة الطفولة، بيد أن نسبة لا يستهان بها من الإصابات تكشف عند أشخاص بالغين لم يعانون خلال طفولتهم من أي عرض موجه للإصابة بالداء الزلقي³.

كما أن المظاهر السريرية للداء الزلقي تختلف كثيراً من مريض إلى آخر، فقد تكون الإصابة شاملة تتناول العفج والصائم والدفاق، فتسوء الحالة العامة إلى درجة تهدد حياة المريض، وقد تبقى الإصابة محصورة في العفج والصائم الداني، فتكون لاعرضية أو ذات أعراض مبهمة، تتطاير بغير دم بعوز الحديد أو عوز الفولات أو نقص تكليس العظام. وإن شدة الإصابة ودرجة امتدادها تحددان حدة المظاهر السريرية وشكلها⁴.

يعد الداء الزلقي من الأمراض الشائعة في أجزاء عديدة من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وسوريا حيث تبلغ نسبة انتشار الداء الزلقي في سوريا 1/62⁵⁻⁶ ، حيث يحدث الداء الزلقي عند الأشخاص المؤهبين وراثياً والذين يعبرون عن مستضادات الكريات البيضاء البشرية HLA DQ8 / أو CD4⁺ HLA DQ2 على ببتيدات خاصة مشتقة من الغلوتين⁷ ، حيث يتم تحديد النمط الفرداني HLA للأشخاص باستخدام الاختبارات الجزيئية للكشف عن الأليلات المسؤولة عن التعبير عن

بروتينات HLA DQ⁸. تعد بروتينات DQ من المتنوّيات المتغايرة حيث يتم تشفير جزئين من البروتين بواسطة جينين في الموقع DQB و DQA على التوالي الذين يقعان على الكروموسوم 6. يتم تشفير المستضد DQ2 بواسطة النمط الفرداني 2.5 DQB1*02-(DQA1*0501) أو النمط الفرداني 2.2 DQ8 (DQB1*02-DQA1*0501) بينما يتم تشفير المستضد DQ8 بواسطة النمط الفرداني DQ8 (DQA1*0201-DQB1*0302-DQA1*0301)⁹⁻¹⁰.

يرتبط الخطر الأكبر للإصابة بالداء الزلاقي بالنمط الفرداني HLA DQ مع وجود HLADQB1*02 و/أو DQB1*0302 في الزيجوت المتماثل. يرتبط غياب الأنماط الفردانية DQ2 و DQ8 بقيمة تتبعية سلبية للإصابة بالداء الزلاقي¹¹, حيث لا توجد معلومات كافية متوفّرة حول توزّع الأليلات HLA DQ في عموم السكان في سوريا حيث قمنا في هذه الدراسة بتقييم تواتر خطر الأليلات والأنمط الفردانية - HLA DQA1-DQB1 في الأشخاص السليمين في سوريا

الطرائق والممواد:

أجريت هذه الدراسة على 100 شخص سليم لا يعانون من الداء الزلاقي من مراجعى العيادات والمراکز الخاصة في سوريا (51 ذكر، 49 أنثى). كان متوسط أعمارهم ± الإنحراف المعياري 14±22 بشرط أن لا يعانون من أي إصابة سابقة بالداء الزلاقي لاهم ولا أقرباؤهم من الدرجة الأولى، ولا يعانون من أية شكاوى هضمية معوية معوبة سرطانات أو أمراض مناعية ذاتية.

تمت الموافقة على هذه الدراسة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة دمشق، وتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين وفي حال كان المشارك قاصراً يتم أخذ موافقة الوالدين.

تواتر الأليلات والأنماط الفردانية لمستضدات الكريات البيضاء البشرية المسببة لخطر الإصابة بالداء الزلاقي عند الأشخاص السليمين في سوريا

أجري القسم العملي لهذه الدراسة في مركز التقانة الحيوية التابع لجامعة البعث حيث تم سحب 5 مل من الدم على مانع تخثر EDTA وتم حفظ العينة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بدرجة حرارة بين 2-8°C ليتم استخلاص الحمض النووي DNA. تم العزل بواسطة عتيدة GF1 الماليزية وفقاً لتعليمات المصنع وتم قياس تركيز ونقاوة الحمض النووي بواسطة مقياس الطيف الضوئي Biospec-nano باستخدام الموجة 260/280.

تم إجراء تفاعل البوليميراز التسلسلي باستخدام الbadenets الخاصة بالأليلات النوعية حيث تم تضخيم كل من الأليلات التالية باستخدام تفاعل البوليميراز التسلسلي¹²⁻¹¹:

DQA1*0201,DQA1*0301,

DQA1*0501,DQA1*0502,DQB1*02,DQB1*0302 كما في الجدول 1:

الجدول 1: تسلسل نيكليوتيدات المشاريع المستخدمة في تفاعل البوليميراز التسلسلي وأطوالهم

تسلاسل الـbadenets (5' to 3')	طول ناتج التضخيم (bp)	المراجع
DQB1*02 Forward	GTGCGTCTTGTGAGCAGAAG	Bunce et al.,1995
DQB1*02 Reverse	CGTGC GGAGCTCCA CTG	
DQB1*0302 Forward	GTGCGTCTTGTGACCAGATA	
DQB1*0302 Reverse	CTGTTCCAGTACTCGGC GG	
DQA1*0201 Forward	ACGGTCC CCTCTGGCCAGTT	Scola et al.,2008
DQA1*0201 Reverse	GCGGGTCAAATCTAAGTCTGT	
DQA1*0301 Forward	CCCTCGCCCTGACCACCG	
DQA1*0301 Reverse	TGC GGAACAGAGGCAACT	
DQA1*0501 Forward	CTCAGACAATTAGATTGACCC	
DQA1*0501 Reverse	GAGTTGGAGCGTTAACAGAC	
DQA1*0502 Forward	CTCAGACAATTAGATTGACCG	
DQA1*0502 Reverse	GAGTTGGAGCGTTAACAGAC	

تم استخدام هرمون التمو كشاهد داخلي وتم التضخيم باستخدام جهاز الدوار الحراري Techne البريطاني، وباستخدام برنامج خاص لكل من أليلات DQA و DQB على حدة، حيث تم إظهار نتائج تفاعل البوليميراز التسلسلي بترحيلها على هلامة الأغاروز بعد إضافة الإيثيديوم برومайд واستخدام أشعة الـ UV.

الدراسة الإحصائية:

تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS الإصدار 22.

النتائج:

تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة بين 4 و 65 سنة حيث تم تنميط الجينات HLA و HLA DQ8 وكانت النسبة المئوية للذكور المشاركين 51 % وكانت النسبة المئوية للإناث 49 %.

كانت نسبة تواتر الأليل DQB1*02 هي 24.5% بينما بلغت نسبة تواتر الأليل DQB1*0302 8.5% ، و يظهر الجدول 3 توزع هذه الأليلات ضمن مجموعة المشاركين في الدراسة:

الجدول 3: تواتر أليلات HLA DQ2 و HLA DQ8 في مجموعة الدراسة

الأليل	مجموعه الدراسة 100 شخص (200 أليل)	% التواتر
DQB1*02	49	24.5
DQB1*0302	17	8.5
DQX	134	67

تواءر الأليلات والأنماط الفردانية لمستضدات الكريات البيضاء البشرية المسببة لخطر الإصابة بالداء الزلقي عند الأشخاص السليمين في سوريا

بلغت نسبة تواهر الأنماط الفردانية المسببة لخطر الإصابة بالداء الزلقي 30 % حيث كان النمط الأكثر انتشاراً هو DQ 2.5/2.5 تليه الأنماط التالية DQ 2.5/2.2، HLA DQ8، DQ2.2/DQ8 HLA بنسبة 5 %. يظهر الجدول 4 توزع الأنماط الفردانية DQ في مجموعة الدراسة كما في الجدول 4:

الجدول 4: توزع الأنماط الفردانية HLA DQ في مجموعة الدراسة

النمط الفرداني	العدد	التواءر %
DQ2.5/DQ8	2	2
DQ2.5/DQ2.5	11	11
DQ2.5/DQ2.2	5	5
DQ8/DQX	5	5
DQ2.2/DQ8	5	5
DQ2.2/DQ2.2	2	2
DQ2.x	3	3
DQX/DQX	67	67

وتنسق مخاطر الداء الزلقي لكل نمط من الأنماط الجينية الخاصة بـ HLA على دراسات المنشورة في أوروبا كما يظهر الجدول 5¹³⁻¹⁵:

الجدول 5: علاقة النمط الفرداني HLA DQ بخطورة الداء الزلقي

النمط الفرداني HLA DQ	الخطورة
DQ2.5/DQ8	عالية جداً
DQ2.5/DQ2.5	عالية جداً
DQ2.5/DQ2.2	عالية جداً

DQ8	عالية جداً
DQ8/DQ2.2	عالية
DQ2.2/DQ2.2	عالية
DQ2.X	منخفضة جداً
DQX.X	منخفضة جداً

المناقشة:

تبثق أهمية التمييز الجيني HLA-DQ في الممارسة السريرية من أن عدم وجود جزيئات HLA DQ8 و HLA DQ2 مهم لقيمة التنبؤية السلبية العالية¹⁵⁻¹⁷، وله دور أساسي في التشخيص كما أن التمييز الجيني يسمح بتحديد خطورة الداء الزلاقي لكل مريض على حدة¹⁶⁻¹⁷.

وفي هذا الصدد من المفيد اعتبار وجود النمط الجيني HLA DQ كعامل خطورة وخطوة أولى في اختبار الأشخاص المؤهبين للإصابة بالداء الزلاقي والذين يجب أن يخضعوا للمتابعة المصلية خاصة أفراد عائلة المصابين بالداء الزلاقي والأشخاص المصابين بأمراض مناعية مثل الداء السكري من النمط الأول وبعض الأمراض التي تترافق مع الداء الزلاقي مثل متلازمة داون و تيرنر¹⁸.

تساعد هذه الاستراتيجية في التشخيص المبكر لدى الأشخاص المعرضين للخطر بالإصابة الذين غالباً ما تكون لديهم الأعراض غير واضحة¹⁹، حيث أن التشخيص المبكر يعني التدخل المبكر ووضع نظام غذائي خال من الغلوتين والذي قد يمنع مضاعفات الداء الزلاقي والأمراض المصاحبة²⁰⁻²¹، ولقد اقترح بعض الباحثين استخدام اختبار HLA DQ في الدراسات المسحية للتحري عن الداء الزلاقي عند مجموعة من السكان²¹⁻²⁴.

تواتر الأليلات والأنماط الفردانية لمستضدات الكريات البيضاء البشرية المسببة لخطر الإصابة بالداء الزلاقي عند الأشخاص السليمين في سوريا

أظهرت هذه الدراسة أن الأنماط الفردانية التي تعطي مخاطر محتملة للإصابة بالداء الزلاقي موجودة بنسبة 30% من السكان في سوريا، 52.7% في السعودية²⁵، 58% في إيران²⁶، 31.9% في شمال الهند²⁷، وقد بلغت هذه النسبة في أوروبا 30-25%²⁸ بينما كانت النسبة في السويد 53%²⁹.

كان تواتر النمط الفرداني DQ2 24.5% في دراستنا بينما كان تواتر النمط الفرداني DQ8 8.5% وتراوح تواتر هذه الأنماط الفردانية في الشعوب الأخرى بين 1-28% لـ DQ8 و 1-9% لـ DQ2³⁰.

إن وجود هذه الأنماط الفردانية تقريباً عند حوالي ثلث السكان من الأشخاص اللاعرضيين يعطي مؤشراً بأن DQ2 و DQ8 ضرورية لإحداث الإصابة بالداء الزلاقي ولكنها غير كافية لإحداث الإصابة كما أن العوامل البيئية أو العوامل الوراثية الإضافية غير المعروفة مسؤولة عن الندرة الملحوظة للداء الزلاقي في هذه الفئة من السكان.

ينتشر الداء الزلاقي في أوروبا وأميركا الشمالية بنسبة 1%， وكانت نسبة انتشار إيجابية الأنماط الفردانية HLA DQ2/DQ8 بين هؤلاء السكان هي من 30-40%³¹⁻³².

وإذاً الخطر الوراثي للإصابة بالداء الزلاقي يتداخل مع بعض الاضطرابات المناعية الذاتية مثل السكري من النمط الأول والصدفية³³، فقد وجدت الدراسات عند الأطفال الإيطاليين أن وجود واحد أو أكثر من HLA DQ المتعدد المغایر يزيد بشكل كبير ليس من احتمالية ظهور الداء الزلاقي فقط ولكن أيضاً الداء السكري من النمط الأول والتهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي³⁴.

كما أظهرت العديد من الدراسات في الأشخاص الغير أوروبيين أن وجود الأنماط الفردانية له دور كبير في خطر الإصابة بالداء الزلاقي، وفي دراستنا كان النمط الفرداني DQ 2.5/DQ 2.5 الذي يترافق بخطورة الإصابة بالداء الزلاقي هو الأكثر انتشاراً بنسبة

11% بينما كانت نسبة انتشار الأنماط الفردانية DQ 2.2/DQ8، DQ2.5/2.2، DQ8 هي 5% وكانت النسبة الأقل DQ 2.2/2.2 وهي 2%^{35,25}.

تزيد هذه الأنماط الفردانية في المجتمعات الغربية خطر الإصابة بالداء الزلاقي من 5 إلى 10 أضعاف مقارنة مع الأفراد الذين لا يملكون هذه الأنماط الفردانية كما أن وجود هذه الأنماط الفردانية عند السكان عندما يكون الداء الزلاقي غير معروف يشير إلى أن العوامل البيئية بما في ذلك كمية ونوع الفحص المستهلك والعوامل الوراثية الأخرى قد تلعب دوراً رئيسياً في حماية السكان من الداء الزلاقي.

إن القابلية الجينية العالية للسكان في سوريا يمكن أن تفسر جزئياً انتشار المرتفع المبلغ عنه مؤخراً في المجتمع السوري.

أظهرت بيانات دراستنا الخطوة الأولى نحو تحديد الأنماط الجينية المنتشرة في سوريا وأن ما يقرب من ثلث الأشخاص الأصحاء المشاركون في دراستنا وهم من الأفراد السوريين يملكون أحد الأنماط الفردانية المسببة لخطورة الإصابة بالداء الزلاقي وهذه الأنماط هي: HLA DQ2.5, DQ2.2,DQ8 الزلاقي لتحديد دور العوامل الأخرى الجينية والبيئية.

المراجع References

1. Sollid LM. The roles of MHC class II genes and post-translational modification in celiac disease. *Immunogenetics*. 2017;69:605–16.
2. Rubio-Tapia A. and Murray JA. Celiac disease. *Curr Opin Gastroenterol.* 26: 116-122; 2010.
3. Fasano A. Clinical presentation of celiac disease in the pediatric population. *Gastroenterology*. 128: S68-S73; 2005.
4. Green PH. and Cellier C. Celiac disease. *N Engl J Med.* 357: 1731-1743; 2007.
5. Cummins AG, Roberts-Thomson IC. Prevalence of celiac disease in the Asia-Pacific region. *J Gastroenterol Hepatol.* 2009;24:1347–1351. doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.05932.x
6. Challar MH, Jouma M, Sitzmann FC, Seferian V, Shahin E. Prevalence of asymptomatic celiac disease in a Syrian population sample. *JABMS*. 2004;6:155–160E.
7. Sollid LM. The roles of MHC class II genes and post-translational modification in celiac disease. *Immunogenetics*. 2017;69:605–16.
8. Rashid M, Lee J. Serologic testing in celiac disease: practical guide for clinicians. *Can Fam Physician*. 2016;62:38–43.
9. Wolters VM, Wijmenga C. Genetic background of celiac disease and its clinical implications. *Am J Gastroenterol.* 2008;103:190–5.
10. Mubarak A, Spierings E, Wolters V, van Hoogstraten I, Kneepkens CMF, Houwen R. Human leukocyte antigen DQ2.2 and celiac disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2013;56:428–30.
11. Bunce M, O'Neill CM, Barnardo MC, Krausa P, Browning MJ, Morris PJ, Welsh KI. Phototyping: comprehensive DNA typing for HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5 & DQB1 by PCR with 144 primer mixes utilizing sequence-specific primers (PCR-SSP) Tissue Antigens. 1995;46:355–367. doi: 10.1111/j.1399-0039.1995.tb03127.x.

12. Scola L, Lio D, Candore G, Forte GI, Crivello A, Colonna-Romano G, Pes MG, Carru C, Ferrucci L, Deiana L, et al. Analysis of HLA-DRB1, DQA1, DQB1 haplotypes in Sardinian centenarians. *Exp Gerontol.* 2008;43:114–118. doi: 10.1016/j.exger.2007.06.007.
13. Megiorni F, Mora B, Bonamico M, Barbato M, Nenna R, Maiella G, et al. HLA-DQ and risk gradient for celiac disease. *Hum Immunol* 2009;70:55–9.
14. Ruiz-Ortiz E, Montraveta M, Cabré E, Herrero-Mata M, Pujol-Borrell R, Palou E, Faner R: HLA-DQ2/DQ8 and HLA-DQB1*02 homozygosity typing by real-time polymerase chain reaction for the assessment of celiac disease genetic risk: evaluation of a Spanish celiac population. *Tissue Antigens* 2014, 84:545-553.
15. Margaritte-Jeannin P, Babron M, Bourgey M, Louka A, Clot F, Percopo S, Coto I, Hugot J, Ascher H, Sollid L, Greco L, Clerget-Darpoux F: HLA-DQ relative risks for coeliac disease in European populations: a study of the European Genetics Cluster on Coeliac Disease. *Tissue Antigens* 2004, 63:562-567.
16. Karell K, Louka AS, Moodie SJ, Ascher H, Clot F, Greco L, et al. HLA types in celiac disease patients not carrying the DQA1*05-DQB1*02 (DQ2) heterodimer: Results from the European Genetics Cluster on Celiac Disease. *Hum Immunol.* 2003;64:469–77.
17. Al-Hussaini A, Sulaiman N, Al-Zahrani M, Alenizi A, El Haj I. Prevalence of Celiac Disease among Type 1 Diabetic Children. *BMC Gastroenterol* 2012;12:180
18. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, Mearin ML, Phillips A, Shamir R, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2012;54:136–60.

19. Ventura A, Magazza G, Greco L. Duration of exposure to gluten and risk for autoimmune disorders in patients with celiac disease.SIGEP Study Group for Autoimmune Disorders in Celiac Disease.*Gastroenterology* 1999;2:297–303.
20. Liu E, Lee HS, Aronsson CA, Hagopian WA, Koletzko S, Rewers MJ, et al. Risk of pediatric celiac disease according to HLA haplotype and country. *N Engl J Med* 2014;371:42–9.
21. Bjorck S, Lynch K, Brundin C, Agardh D. Repeated screening is necessary for detection of celiac disease but can be restricted to at genetic risk birth cohorts. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2016;62:271–5.
22. Mearin ML, Ivarsson A, Dickey W. Coeliac disease: Is it time for mass screening? Best practice & research. *Clin Gastroenterol* 2005;19:441–52.
23. Francavilla R, Castellaneta S. Inverting the Diagnostic Pyramid in Celiac Disease: HLA Typing for Screening Suspects of Celiac Disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2016;63:e20.
24. Stanković B1, Radlović N, Leković Z, Ristić D, Radlović V, Nikčević G,et al. HLA genotyping in pediatric celiac disease patients. *Bosn J Basic Med Sci* 2014;14:171–6.
25. Al-Hussaini A, Alharthi H, Osman A, Eltayeb-Elsheikh N, Chentoufi A: Genetic susceptibility for celiac disease is highly prevalent in the Saudi population. *Saudi Journal of Gastroenterology* 2018, 24:268.
26. Yachha S: Celiac disease: India on the global map. *Journal of Gastroenterology and Hepatology* 2006, 21:1511-1513.
27. Pietzak M, Schofield T, McGinniss M, Nakamura R: Stratifying Risk for Celiac Disease in a Large At-Risk United States Population by Using HLA Alleles. *Clinical Gastroenterology and Hepatology* 2009, 7:966-971.

28. SOLLID L, LIE B: Celiac Disease Genetics: Current Concepts and Practical Applications. *Clinical Gastroenterology and Hepatology* 2005, 3:843-851.
29. Sandström O, Rosén A, Lagerqvist C, Carlsson A, Hernell O, Höglberg L, Ivarsson A: Transglutaminase IgA Antibodies in a Celiac Disease Mass Screening and the Role of HLA-DQ Genotyping and Endomysial Antibodies in Sequential Testing. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition* 2013, 57:472-476.
30. Lionetti E, Catassi C: Co-localization of gluten consumption and HLA-DQ2 and -DQ8 genotypes, a clue to the history of celiac disease. *Digestive and Liver Disease* 2014, 46:1057-1063.
31. Kårhus LL, Thuesen BH, Skaaby T, Rumessen JJ, Linneberg A. The distribution of HLA DQ2 and DQ8 haplotypes and their association with health indicators in a general Danish population. *United European Gastroenterol J.* 2018;6:866–78.
32. Lundin KE, Qiao SW, Snir O, Sollid LM. Coeliac disease – from genetic and immunological studies to clinical applications. *Scand J Gastroenterol.* 2015;50:708–17.
33. Barker JM. Clinical review: type 1 diabetes-associated autoimmunity: natural history, genetic associations, and screening. *J Clin Endocrinol Metab.* 2006;91:1210–7.
34. Larizza D, Calcaterra V, Klersy C, et al. Common immunogenetic profile in children with multiple autoimmune diseases: the signature of HLA-DQ pleiotropic genes. *Autoimmunity.* 2012;45:470–5.
35. Almeida F, Gandolfi L, Costa K, Picanço M, Almeida L, Nóbrega Y, Pratesi R, Pratesi C, Selleski N: Frequency of HLA-DQ, susceptibility genotypes for celiac disease, in Brazilian newborns. *Molecular Genetics & Genomic Medicine* 2018, 6:779-784.

